



Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag

Stadtgemeinde Kapfenberg  
Koloman-Wallisch-Platz 1  
8605 Kapfenberg

Bearb.: Monika Jerabek  
Tel.: +43 (3862) 899-162  
Fax: +43 (3862) 899-550  
E-Mail: bhbm-  
veterinaerreferat@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte  
Geschäftszeichen (GZ) anführen

GZ: BHBM-20326/2025-4

Bruck an der Mur, am 20.01.2025

Ggst.: Tierseuchen 2025; Maul- und Klauenseuche Überwachung 2025 /  
MKS 2025

## Runderlass Nr. 1/2025

An alle Stadt, Markt- und Gemeindeämter des Bezirkes Bruck-Mürzzuschlag

Aufgrund des aktuellen Ausbruchs von Maul- und Klauenseuche in einem Wasserbüffelbetrieb in Brandenburg (Deutschland), wird das Merkblatt für Landwirte bezüglich der MKS, mit dem Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. um Verständigung der Landwirte, übermittelt.

Mit freundlichen Grüßen  
Der Bezirkshauptmann i.V.

Mag. Lukas Wachter  
(elektronisch gefertigt)

### Beilage

	<b>Unterzeichner</b>	Land Steiermark
	<b>Datum/Zeit-UTC</b>	2025-01-20T15:08:07+01:00
<b>Prüfinformation</b>	Das elektronische Original dieses Dokumentes wurde amtssigniert. Hinweise zur Prüfung dieser elektronischen Signatur bzw. der Echtheit des Ausdrucks finden Sie unter <a href="https://as.stmk.gv.at">https://as.stmk.gv.at</a>	

8600 Bruck an der Mur • Dr.-Theodor-Körner-Straße 34  
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar  
<https://datenschutz.stmk.gv.at> • UID ATU37001007  
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG: IBAN AT302081500006415467 • BIC STSPAT2G



## Merkblatt Maul und Klauenseuche (MKS) für Landwirte und Viehhändler

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende, anzeigepflichtige Viruserkrankung der Paarhufer und Schwielensohler.

### Vorkommen:

In der Türkei, in Afrika, im Nahen Osten, sowie vielen Ländern in Asien und in Teilen Südamerikas kommt MKS regelmäßig vor. In der EU trat sie zuletzt 2011 in Bulgarien auf. Das erste Mal seit 37 Jahren ist das Virus im Jänner 2025 wieder in Deutschland (Brandenburg) aufgetreten.

### Betroffene Tierarten:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Rinder            | - Hirsche      |
| - Büffel            | - Antilopen    |
| - Schweine          | - Wildschweine |
| - Ziegen            | - Kamele       |
| - Schafe            | - Giraffen     |
| - Lamas und Alpakas | - Elefanten    |

### Übertragung:

Die Übertragung findet durch direkten Kontakt zwischen empfänglichen Tieren statt. Erkrankte Tiere scheiden das Virus über Speichel, Milch, Samen und Blasenflüssigkeit aus. Indirekt kann das Virus zudem durch kontaminiertes Fleisch, Milchprodukte, Futter, Gegenstände, Nagetiere, Fahrzeuge und Personen übertragen werden. Auch eine Übertragung über die Luft ist über weite Strecken (bis zu 60 km) möglich. Das sehr widerstandsfähige Virus kann bis zu 15 Wochen in Futter und Abwasser und im tiefgefrorenen Fleisch mehrere Jahre überleben.

### Klinisches Bild:

Meist erkrankt ein Großteil eines betroffenen Tierbestandes. Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome beträgt 2-7 Tage. Betroffene Tiere zeigen folgende Symptome:

- Blasenbildung (Aphten) im Maulbereich, Euter und Klauen
  - Vermehrtes speicheln
  - Widerstand gegen das Melkgeschirr
  - Lahmheiten
- Hohes Fieber (40-42 °C)

- Schmerzen, Apathie und Appetitlosigkeit
- Bei Rindern
  - Rückgang der Milchleistung
- Bei Schweinen
  - Starke Veränderungen im Bereich der Klauen und Extremitäten -> Ausschuhem möglich
  - Todesfälle ohne klinische Symptome bei Ferkel möglich
- Bei Schafen
  - Eher unauffällige Symptome
  - Lahmheit oft einziges Symptom

**Verdacht:**

Besteht der Verdacht auf MKS ist unverzüglich der zuständige Amtstierarzt/die zuständige Amtstierärztin zu kontaktieren. Entsprechende Diagnostik und Maßnahmen werden daraufhin eingeleitet. Wichtig ist, dass bis zum Vorliegen der Diagnose keine Tiere, auch nicht zur TKV, vom verdächtigen Betrieb verbracht werden.

**Therapie:**

Bestätigt sich der Verdacht auf MKS ist eine Behandlung verboten und alle empfänglichen Tierarten eines Betriebes müssen gekeult werden.

**Übertragung auf den Menschen:**

Der Konsum von pasteurisierter Milch, daraus hergestellten Milchprodukten oder von Fleisch stellt keine Gefahr für den Menschen dar. Bei engem Kontakt mit betroffenen Tieren (Landwirte, Tierpfleger, Tierärzte, Viehhändler etc.), kann es zu einer Infektion des Menschen kommen, die in der Regel nicht zu einer Erkrankung führt.

**Vorbeugung:**

Tierhalter:innen werden ersucht, vermehrt auf allgemeine Biosicherheitsmaßnahmen (saubere Stallkleidung, Quarantäne, Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, Zutritt für Betriebsfremde zu Stallhaltungen verhindern, etc.) zu achten. Die Einschleppung des Virus über infizierte Tiere (infizierte Tiere scheiden das Virus bereits vor Auftreten der ersten Symptome aus!) oder kontaminierte Gegenstände muss verhindert werden. Aufgrund der unklaren Lage, dem unbekanntem Ursprung der Tierseuche und der gravierenden Konsequenzen eines allfälligen Ausbruches in Österreich werden Halter empfänglicher Tierarten jedoch weiterhin dringend um erhöhte Aufmerksamkeit ersucht!

Angeschlagen am 21. 1. 2025 *sp*

Abgenommen am bis auf Widerruf

Stadtgemeinde Kapfenberg  
IT und Service